

Basfoliar 36 Extra

Dusíkaté listové hnojivo s hořčíkem a mikroprvky

Výrobce: **COMPO GmbH & Co.KG., Münster, Německo**

Dovozce: **AgroEfekt, s.ro. 250 01 Zápy 169**

Evidenční číslo: **O181**

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Složení:	27% N	Celkový obsah dusíku
	18,7% N	karbamidový dusík
	4,7% N	nitratový dusík
	3,6% N	amonný dusík
	3% MgO	vodorozpustný oxid hořečnatý
	0,02% B	vodorozpustný bor
	0,2% Cu	vodorozpustná měď
	0,02% Fe	vodorozpustné železo
	1,0% Mn	vodorozpustný mangan
	0,005% Mo	vodorozpustný molybden
	0,01% Zn	vodorozpustný zinek

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (v mg/kg hnojiva): kadmium 1,0; olovo 10,0; rtuť 1,0; arsen 10,0; chrom 50,0

Rozsah a způsob použití:

Basfoliar 36 Extra je vhodný pro použití v intenzivních pěstebních podmínkách, kdy je kromě vysoké potřeby dusíku pro přihnojení i zvýšený požadavek na přísun hořčíku a manganu. Na půdách s vysokou hodnotou pH a s tím spojenou možností blokace manganu, v suchých oblastech, popř. za déle trvajícího sucha zajišťuje přísun hořčíku, manganu a dalších mikroprvků.

Kombinace s přípravky na ochranu rostlin

Hnojivo je při uvedených koncentracích mísitelné s běžnými přípravky na ochranu rostlin. Před velkoplošnou aplikací takto vzniklých směsí je však vždy doporučeno vyzkoušet je nejprve na menší ploše. Vždy respektovat údaje výrobce o vzájemné mísitelnosti. Basfoliar 36 Extra je nutno vždy nejprve smíchat s vodou, potom možno přidat další přípravek.

Aplikační dávky:

Zemědělské plodiny	l/ha
Obilniny, brambory, řepka, kukuřice	6-12
Luskoviny na semeno, cukrovka, slunečnice	4-10

- hrách a bob přihnojit jednou před květem a dvakrát po odkvětu (opad květů až tvorba lusků) v odstupu 10 – 14 dnů.
- slunečnici přihnojovat od fáze čtyř listů do 80 cm výšky ve 2 – 3 aplikacích v kombinaci s pesticidy

Ostatní plodiny	l/ha	koncentrace postřikové jichy (%)
Ovoce¹⁾		
Jádrové ovoce ²⁾	7,5 – 12,0	0,5 – 0,8
Peckové ovoce ³⁾	3,5 – 4,5	0,25 – 0,3
Drobné ovoce ³⁾	2,25	0,15
Angrešt ³⁾	1,5	0,1
Jahody ³⁾	3,0 – 3,5	0,2 – 0,25
Vinice (neaplikovat v době květu)		
aplikace postřikovačem	max. 4,5	0,3
aplikace rosiči		0,6
Chmelnice	7,5	0,5

Ostatní plodiny	l/ha	koncentrace postřikové jichy (%)
Školky dřevin ⁴⁾	7,5	0,5
Polní zelenina		
Celer, špenát	4,0 – 8,0	1,0 – 2,0
Hrášek	3,2 – 4,0	0,8 – 1,0
Zelí, květák	8,0 – 12,0	2,0 – 3,0
Kedluben	4,0 – 8,0	1,0 – 2,0
Čínské zelí	2,0 – 3,0	0,5
Rajčata	3,0 – 6,0	0,75 – 1,0
Salát	2,0 – 4,0	0,4 – 0,6
Okurky	2,0 – 6,0	0,5 – 1,0

¹⁾ Při aplikaci rosiči zvýšit koncentraci na dvoj- až trojnásobek dle typu stroje.

²⁾ U odrůd jabloní náchylných k rzivosti (např. Golden Delicious) neaplikovat před fází vlašského ořechu.

³⁾ Při nižším množství vody nesmí být u třešní, jahod a drobného ovoce zvyšována koncentrace.

⁴⁾ Množství vody do 400 l/ha.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech.

Hnojivo se dodává balené.

Hmotnost náplně:

Datum výroby: