

Proman[®] 10L + Command[®] 0,8L PACK



Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenze kapsulí určený k preemergentní aplikaci proti jednoletým dvouděložným plevelům v řepce oleje, bramborách, hrachu, máku, okurkách, tykvi, fazolu,

hrachoru, cizrně, brukvovité zelenině (kromě kedlubny) a cukrovce.

účinná látka: klomazon 360 g/l ; < 35% hmot.

Přípravek obsahuje další klasifikované látky: dusičnan sodný 5%, chlorid vápenatý 5%.

H413 MŮŽE VYVOLAT DLOUHODOBÉ ŠKODLIVÉ ÚČINKY PRO VODNÍ ORGANISMY.

P501 ODSTRÁŇTE OBSAH/OBAL PŘEDÁNÍM OPRAVNĚNÉ OSOBE NEBO VRÁCENÍM DODAVATELI

EUH208 OBSAHUJE 1,2-BENZOISOTHAZOL-3(2H)-ON. MŮŽE VYVOLAT ALERGICKOU REAKCI.

EUH401 DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

SP1 NEZNEČIŠŤUJTE VODY PŘÍPRAVKEM NEBO JEHO OBALEM. (NEČIŠTĚTE APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI POVRCHOVÝCH VOD/

ZABRAŇTE KONTAMINACI VOD SPLACHEM Z FAREM A Z CEST).

PŘÍPRAVEK NENÍ VYLOUČEN Z POUŽITÍ V OCHRANNÉM PÁSMU II. STUPNĚ ZDROJŮ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD. PŘÍPRAVEK NEVYŽADUJE SPECIFICKÁ OPATŘENÍ Z HLEDISKA OCHRANY PTAČTVA, SUCHOZEMSKÝCH OBRATLOVCŮ, VČEL, NECÍLOVÝCH ČLENOVCŮ, PŮDNÍCH MIKROORGANISMŮ A PŮDNÍCH MAKROORGANISMŮ A NECÍLOVÝCH SUCHOZEMSKÝCH ROSTLIN. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘILOŽENÝ NÁVOD K POUŽITÍ.

Čisté množství přípravku:

0,8 Le

Balení a objem:

HDPE lahev; šroubový uzávěr

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

Evidenční číslo přípravku: 4475-0

Držitel rozhodnutí o povolení / Výrobce přípravku:

FMC[®]

FMC Corporation,
1735 Market Street,
PA 19103, Philadelphia,
USA

Právní zástupce v ČR:
F&N Agro Česká republika
spol. s r.o., Na Maninách
876/7, 170 00 Praha 7

Datum výroby / Číslo
šarže: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti:
2 roky od data výroby;
teplota skladování
+5 až +30°C

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře pro přípravky na ochranu rostlin a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.



BELCHIM
—Crop Protection—



Působení přípravku:

Účinná látka přípravku Command 36 CS kломazon náleží do skupiny oxazolidinonů. Proniká do rostlin kořeny a u citlivých druhů inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů.

1) Rozsah povoleného použití:

Command 36 CS

1. Plodina, oblast použití	2. Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3. Poznámka
řepka olejka	svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté	0,25 l/ha	AT	
brambor				
hrách				
mák setý				

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Dávka vody: 300 – 400 l vody/ha

Max. počet ošetření: 1x za vegetaci plodiny

růstová fáze plodiny v době aplikace:

- preemergentně do 3 dnů po zasetí
- brambory – po slepé proorávce, vegetační vrcholy musejí být pod povrchem půdy

Růstová aplikace plevelů v době aplikace: nejsou vzešlé

Plevele citlivé: svízel přítula, ptačinec žabinec, kokoška pastuška, tobolka

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami.

Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Při aplikaci na písčitéch půdách, zejména s obsahem humusu pod 1 %, není vyloučeno poškození porostu.

Pokud po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Případné příznaky fytotoxicity jsou zpravidla přechodného charakteru bez vlivu na další růst a výnos plodiny.

Pěstování následných plodin bez omezení.

Citlivost náhradní plodiny konzultujte s držitelem povolení.



2) Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona č. 326/2004 sb., v platném znění:

Plodina oblast použití	Škodlivý činitel, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka
okurka setá	jednoleté dvouděložné plevele, některé jednoděložné	0,25 l/ha + 300-400 l vody/ha	45	preemergentní aplikace do 3 dnů po zasetí
tykev obecná		0,2 - 0,25 l/ha + 300-400 l vody/ha	AT	max. 1x, preemergentně do 3 dnů po zasetí
fazol keříčkový	plevele dvouděložné jednoleté	0,15 - 0,2 l/ha + 300-500 l vody/ha	AT	preemergentní do 3 dnů po zasetí, max. 1x
hrachor setý	plevele dvouděložné jednoleté	0,125 - 0,15 l/ha + 300-500 l vody/ha	AT	preemergentní do 3 dnů po zasetí, max. 1x

OL = ochranná lhůta pro další manipulaci a uvádění na trh (dny)
 Maximální počet ošetření na plodinu během vegetace: 1x
 Termín aplikace: preemergentně, do 3 dnů po zasetí

3) Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení evropského parlamentu a rady (es) č. 1107/2009 Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2, odst. 2, písm. h) zákona č. 326/2004 sb., v platném znění.

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL
zelenina brukvovitá (kromě kedlubny)	plevele dvouděložné jednoleté	0,15-0,25 l/ha	AT	3) preemergentní aplikace, pouze v polních podmínkách
cukrovka	mračňák Theophrastův	0,05-0,1 l/ha	AT	1) od: 12 BBCH, do: 18 BBCH 2) od: 09 BBCH, do: 14 BBCH

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

zelenina brukvovitá (kromě kedlubny):

Dávka vody: 300 – 400 l vody/ha

Max. počet ošetření: 1x v plodině

Růstová fáze plodiny v době aplikace: preemergentně do 3 dnů po zasetí

Druhá a odrůdová citlivost: není známa, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy.
 Riziko případného poškození ošetřovaných rostlin nese pěstitel



(ošetřovatel).

cukrovka:

Dávka vody: 200 – 400 l vody/ha

Max. počet ošetření: max. 3x do celkové dávky 0,2 l/ha

Interval mezi aplikacemi: 7 dnů

Dávkování:

0,05 l/ha

cukrovka: BBCH 12-14

mračňák: BBCH 09-10

0,1 l/ha

cukrovka: BBCH 14-18

mračňák: BBCH 09-14

Bezpečnostní opatření týkající se správné zemědělské praxe:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku klomazon na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Další omezení:

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Příprava postřikové kapaliny:

Před použitím přípravku důkladně protřepejte obsah v uzavřeném obalu. Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a doplňte vodou na požadovaný objem. Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky vpravujte do nádrže odděleně.

Čištění postřikovače:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinné látky klomazon, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1. Okamžitě po ošetření nádrž vyprázdněte a opláchněte zvenčí čistou vodou.
2. Nádrž důkladně vypláchněte čistou vodou, propláchněte ramena, hadice a trysky.
3. Naplňte nádrž do poloviny čistou vodou a přidejte roztok čpavku (100 ml čpavkové vody na 100 l vody) nebo odpovídající množství čisticího přípravku (např.: All Clear Extra®), zamíchejte a opět propláchněte ramena a trysky. Nádrž znovu naplňte a ponechte 15 min stát bez míchání, znovu propláchněte ramena a trysky a nádrž vyprázdněte. V případě použití čisticích prostředků postupujte podle návodu na jejich použití.
4. Trysky a síta čistěte odděleně rovněž v roztoku čpavkové vody nebo čisticím roztokem (např.: 50 ml All Clear Extra na 10 l vody) a pak propláchněte čistou vodou.
5. Nádrž, ramena, hadice a trysky propláchněte čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a nádrž vypusťte. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Bezpečnostní opatření týkající se životního prostředí:

SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody/zabraňte kontaminaci





vod splachem z farem a z cest).

Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních mikroorganismů a půdních makroorganismů a necílových suchozemských rostlin. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob, které manipulují s přípravkem, osobními ochrannými prostředky (OOPP):

Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě aplikační kapaliny a při aplikaci:

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná.

Ochrana rukou:

gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420 + A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1.

Ochrana očí a obličeje:

není nutná.

Ochrana těla:

celkový pracovní/ ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, popř. podle ČSN EN ISO 13982-1 nebo jiný ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688.

Dodatečná ochrana hlavy:

není nutná.

Dodatečná ochrana nohou:

pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu).

Společný údaj k OOPP:

poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba vyměnit.

Další označení z hlediska ochrany zdraví člověka:

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného / pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte (ty OOPP, které nelze prát, důkladně očistěte/umyjte alespoň teplou vodou a mýdlem/pracím práškem). U textilních prostředků se při jejich praní/ošetřování/ čištění řiďte piktogramy/symboly, umístěnými zpravidla přímo na výrobku.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

První pomoc:

Všeobecné pokyny:

Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí; podráždění kůže nebo podezření na alergickou reakci; apod.) nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku nebo příbalového letáku.

První pomoc při nadýchání aerosolu: Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.

První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte prostor pod víčky po





dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahe tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek, obal přípravku popř. bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Podmínky správného skladování:

Skladovat jen v originálních dobře uzavřených obalech. Skladovat na chladném, suchém, dobře větraném místě. Skladujte odděleně od potravin, nápojů, krmiv. Skladovat mimo dosah dětí a zvířat.

Skladovatelnost: +5°C až +30°C

Způsob likvidace obalu, neupotřebitelných zbytků, postřikové kapaliny a oplachových vod:

Zákaz opětovného použití obalu.

Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení spálí ve schválené vysokoteplotní spalovně. Oplachové vody se použijí pro přípravu postřikové kapaliny. Případné nepoužitelné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové kapaliny zředte vodou v poměru cca 1:10 a vystříkejte beze zbytku na ošetřené ploše, zbytky však nesmí zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod.

Aplikační zařízení vždy důkladně opláchněte vodou.

Dotatková informace držitele rozhodnutí o povolení:

Držitel rozhodnutí o povolení a právní zástupce nepřebírají žádnou zodpovědnost za ztráty a škody způsobené nesprávným skladováním a použitím přípravku, případným mícháním nebo sekvenčním použitím s jinými přípravky jinak než v souladu s doporučeným použitím v této etiketě a v platném Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin, taktéž ani za následky vyplývající z použití přípravku během anebo před vznikem mimořádných povětrnostních podmínek, a nebo při ošetření odrůd, o kterých není držitel rozhodnutí o povolení/právnímu zástupci známo, že jsou mimořádně citlivé na poškození způsobené přípravkem.

Command® a FMC® jsou registrované ochranné známky společnosti FMC Corporation, USA.





Proman[®] 10L + Command[®] 0,8L PACK



Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenze kapsulí určený k preemergentní aplikaci proti jednoletým dvouděložným plevelům v řepce oleje, bramborách, hrachu, máku, okurkách, tykvi, fazolu,

hrachoru, cizrně, brukvovité zelenině (kromě kedlubny) a cukrovce.

účinná látka: klomazon 360 g/l ; < 35% hmot.

Přípravek obsahuje další klasifikované látky: dusičnan sodný 5%, chlorid vápenatý 5%.

H413 MŮŽE VYVOLAT DLOUHODOBÉ ŠKODLIVÉ ÚČINKY PRO VODNÍ ORGANISMY.

P501 ODBRAŇTE OBSAH/OBAL PŘEDÁNÍM OPRAVNĚNÉ OSOBE NEBO VRÁCENÍM DODAVATELI

EUH208 OBSAHUJE 1,2-BENZOISOTHIAZOL-3(2H)-ON. MŮŽE VYVOLAT ALERGICKOU REAKCI.

EUH401 DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

SP1 NEZNEČIŠŤUJTE VODY PŘÍPRAVKEM NEBO JEHO OBALEM. (NEČIŠTĚTE APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI POVRCHOVÝCH VOD/

ZABRAŇTE KONTAMINACI VOD SPLACHEM Z FAREM A Z CEST).

PŘÍPRAVEK NENÍ VYLOUČEN Z POUŽITÍ V OCHRANNÉM PÁSMU II. STUPNĚ ZDROJŮ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD. PŘÍPRAVEK NEVYŽADUJE SPECIFICKÁ OPATŘENÍ Z HLEDISKA OCHRANY PTAČTVA, SUCHOZEMSKÝCH OBRATLOVCŮ, VČEL, NECÍLOVÝCH ČLENOVCŮ, PŮDNÍCH MIKROORGANISMŮ A PŮDNÍCH MAKROORGANISMŮ A NECÍLOVÝCH SUCHOZEMSKÝCH ROSTLIN. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘILOŽENÝ NÁVOD K POUŽITÍ.

Čisté množství přípravku:

0,8 Le

Balení a objem:

HDPE lahev; šroubový uzávěr

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

Evidenční číslo přípravku: 4475-0

Držitel rozhodnutí o povolení / Výrobce přípravku:

FMC[®]

FMC Corporation,
1735 Market Street,
PA 19103, Philadelphia,
USA

Právní zástupce v ČR:
F&N Agro Česká republika
spol. s r.o., Na Maninách
876/7, 170 00 Praha 7

Datum výroby / Číslo šarže: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti:
2 roky od data výroby;
teplota skladování
+5 až +30°C

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře pro přípravky na ochranu rostlin a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.



BELCHIM
—Crop Protection—