

SANATEX VS

POMOCNÝ PROSTŘEDEK K OCHRANĚ RAN PO ŘEZU A/NEBO PO JINÉM MECHANICKÉM POŠKOZENÍ OVOCNÝCH, OKRASNÝCH A LESNÍCH DŘEVIN

VZHLED A SLOŽENÍ:

SANATEX VS je pasta hnědé (bílo-šedé) barvy, charakteristického zápachu, mísitelná s vodou, nehořlavá.

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI:



ÚČINNÁ LÁTKA/OBSAH:

VINYL-ACETÁTOVÁ DISPERZE 450 g / kg

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 1532-1C

DRŽITEL REGISTRACE: TORA, spol. s r.o., Olšík 583, 763 64 Spytihněv, ČR

Obsažené nebezpečné látky:

Hexamethylentetramin (methenamin) 2,5% (CAS: 100-97-0)

Standardní věty o nebezpečnosti:

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné nakládání:

P261 Zamezte vdechování aerosolů.

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

P302 + P352 Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

SIGNÁLNÍ SLOVO: Varování

P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/znečištěný obal jako nebezpečný odpad.

Bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí:

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

Doplňující informace:

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Expozice ostatních skupin necílových organismů je vyloučena.

Pomocný prostředek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel.

ROZSAH POUŽITÍ: Při ošetření poraněných stromů po řezu, po mechanickém poškození (těžba apod.) a po poškození zvířei (např. vytloutání) se prostředek aplikuje štětcem, kartáčem nebo vhodným postřikovačem v průběhu celého roku. SANATEX VS může být aplikován i při teplotě těsně nad bodem mrazu.

APLIKAČNÍ POZNÁMKY:

SANATEX VS se používá zpravidla bez ředění, je mísitelný s vodou, ale zředěním se jeho účinnost podstatně snižuje. Před použitím důkladně promíchat,

- při sanaci poraněných stromů zvířei, mechanickým poškozením při těžbě a úpravách korun stromů se SANATEX VS nanáší na poraněná místa štětcem nebo kartáčem, popř. se nastříká – k postřiků jsou vhodné ruční zádové postřikovače s membránovým čerpadlem a s vířivou tryskou,
- doporučuje se při plnění postřikovače procedit SANATEX VS sítím postřikovače,
- prostředek může být nanášen i na vlhký podklad při teplotě od +5°C, po nanesení ale musí zaschnout, aby nebyl splaven deštěm.

DOBA POUŽITELNOSTI: 24 měsíců od data výroby při správném skladování v původních neporušených obalech. Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh pod dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozborů přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

LIKVIDACE, ČIŠTĚNÍ: Prázdné plastové obaly od prostředku se po důkladném vypláchnutí mohou předat k recyklaci do sběru nebo spálí ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 –1400°C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin. Všechny pomůcky, především postřikovače, musí být ihned po skončení práce důkladně vmyty vodou s přísadkou saponátů nebo 3 %ním roztokem sody a poté čistou vodou. Zaschlý prostředek lze velmi těžko odstranit. Oplachové vody se použijí na přípravu postřikové kapaliny. Zbytky prostředku se smísí s hořlavým materiálem (např. dřevěné piliny) a spálí se ve spalovně pro pevné látky.

SKLADOVÁNÍ, DOPRAVA:

SANATEX VS se skladuje v čistých, suchých a uzavřených skladech při teplotě od 5°C do 30°C, oddělených od skladů s potravinami a krmivými. Při skladování a dopravě nelze palety stohovat. SANATEX VS se přepravuje krytými dopravními prostředky. Při venkovní teplotě pod 0°C musí být SANATEX VS přepravován vozidly vybavenými tepelnou izolací.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI: Při práci s přípravkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky s přihlédnutím na způsob aplikace. Ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ (ČSN EN 13034+A1, ČSN EN ISO 13688), vhodný prostředek na ochranu očí (ČSN EN 166), čepice se štítkem nebo klobouk, ochranné rukavice označené grafickou značkou / piktogramem pro chemická nebezpečí (ČSN EN 420+A1, ČSN EN 374-1), pracovní nebo ochranná obuv (ČSN EN ISO 20346, ČSN EN ISO 20347). Při práci s přípravkem SANATEX VS je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po skončení práce je třeba umýt ruce vodou a mýdlem, doporučuje se ošetřit pokožku reparačním krémem.

PRVNÍ POMOC:

Při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím čisté (pitné) vody. Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití prostředku vypláchnout postiženému ústa, podat mu 0,5 l vlažné vody a vyvolat zvracení, pokud je postižený při vědomí. Postižený, který požil SANATEX VS nebo má oči zasažené tímto přípravkem, musí být dopraven k lékaři.

UPOZORNĚNÍ:

Výrobce bere záruku na kvalitu výrobku ve smyslu pro něho platné podnikové normy. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím prostředku. Při správném skladování je záruční doba 24 měsíců od data výroby.

OBJEM NÁPLNĚ: 10 litrů

POUŽITELNÉ DO:

ČÍSLO ŠARŽE:



NÁVOD K POUŽITÍ:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	3) Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka
lesní dřeviny	ochrana ran po mechanickém poškození	0,5 - 1 kg / 1 m ² ošetřené plochy		nátěr, postřik
okrasné dřeviny	ochrana ran po řezu, ochrana ran po mechanickém poškození	0,5 - 1 kg / 1 m ² ošetřené plochy		nátěr, postřik
ovocné dřeviny	ochrana ran po řezu, ochrana ran po mechanickém poškození	0,5 - 1 kg / 1 m ² ošetřené plochy		nátěr, postřik

BALENÍ:

SANATEX VS se dodává v PP kbelících o objemu 10 l a v HDPE dózách o objemu 1 l a 2,5 l.