

řepa cukrová:	2 l/ha	v 600 l vody	ve fázi 2-6 páru pravých listů tj. – 6 týdnů po zasetí
řepka olejná:	2 l/ha	v 600 l vody	ve fázi plouživého růstu , tj. ve 2. polovině měsíce dubna
ječmen jarní, pšenice ozimá, triticale:	2 l/ha	v 600 l vody	první aplikace ve fázi odnožování (25 DC) až do počátku kvetení (40 DC), druhá aplikace v dávce 2 l/ha v 600 l vody za 14-21 dnů po prvním postřiku
chmel:	2 l/ha	v 1 - 2000 l vody	první aplikace 25,6 – 10,7, druhá aplikace za 14 dnů po první aplikaci.
brambory:	3 l/ha	do 600 l vody	v období tvorby poupát do počátku kvetení.
mak setý:	3 l/ha	v 600 l vody	na počátku intenzivního růstu (na počátku tvorby květních poupát)
kukuřice:	2 l/ha	v 600 l vody	první aplikace – v údobí výšky porostu 30-45 cm, druhá aplikace po 14 dnech
konopí seté:	2 l/ha	v 350 l vody	na počátku tvorby květů, cca v 1. dekádě června
salát hlávkový:	2,5 l/ha	v 600 l vody	v období tvorby listové růžice před jejím uzavíráním v hlávku
celer bulvový:	3 l/ha	v 600 l vody	4 až 5 týdnů po výsadbě do záhonů
pór pravý:	0,2% = 2 ml 0,4% = 4 ml 2,5 l/ha	na 1l vody na 1l vody v 600 l vody	k postřiku na pravé listy – 1x za 14 dnů zálivka pro kořenovou výživu – 1x za 10 až 14 dnů v období tvorby 5-6 párů pravých listů
rajčata polní:	1 l/ha	v 500 l vody	první aplikace – po výsadbě
paprika polní:	1,5 l/ha 1 l/ha 2 l/ha 2,5 l/ha	v 1000 l vody v 1000 l vody v 800 l vody v 1000 l vody	druhá aplikace – ve fázi butonizace třetí aplikace – při kvetení 1. vijanu první aplikace – na začátku kvetení druhá aplikace – za tři týdny po první aplikaci
okurky polní:	2 l/ha 3 l/ha	v 1000 l vody v 1000 l vody	první aplikace – na začátku kvetení druhá aplikace – 14 dní po první aplikaci
cibulové květiny:	1 l 2 l	ve 100 l vody ve 100 l vody	první aplikace – na 1000 cibulek po výsadbě druhá aplikace – na 1000 cibulek 4-5 týdnů po výsadbě
sója:	2 l/ha	v 350 l vody	před začátkem tvorby květních orgánů, tj. cca v 2. dekádě června
okrasný trávnik:	1,5% roztok – 6 l roztoku	na 100m ²	po seči ve večerních nebo časných ranních hodinách
produkční trávnik:	2 l	ve 350 l vody	v druhé dekádě dubna
jetel luční:	2 l/ha	ve 350 l vody	ve fázi dokončujícího prodlužování výhonů v lodyhy, obvykle poslední dekáda dubna.
balkónové květiny, pelargónie,begonie:	1% vodní roztok	foliární postřik	ve stádiu prvních lístků., nebo 7-10 dnů po výsadbě , případně před začátkem tvorby květních orgánů
slunečnice:	2 l/ha 2 l/ha	v 300 l vody v 600 l vody	ve stádiu dlouživého růstu na začátku tvorby generativních orgánů – úborů první aplikace – v údobí výšky porostu 30-45 cm, druhá aplikace po 14 dnech
broskvoně:	0,5% vodní roztok	foliární postřik	na počátku tvorby květních orgánů
vinná réva:	2l/ ha	ve 300 l vody	aplikace postřikem dvakrát až třikrát stejnou dávkou 1.aplikace na jaře před květem (červen), 2.aplikace po odkvětu ve stádiu tuberizace, 5 týdnů po první aplikaceaplikaci, obvykle v druhé polovině července 3.aplikace v případě mimořádných stresových podmínek